

Памятка по подготовке с препаратом ЛАВАКОЛ

ЗА 3-5 ДНЕЙ ДО ОПЕРАЦИИ ОТМЕНИТЬ КРОВОРАЗЖИЖАЮЩИЕ!
(ксарелто, кардиомагнил, аспирин, эликвис, клопидогрел и тд)

ЗА 3 ДНЯ ДИЕТА (Можно: прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирная рыба, нежирные кисломолочные продукты, яйца. Чай и кофе без молока, компот без ягод, сок без мякоти, безалкогольные неокрашенные напитки, ВОДА)

Запрещено: всю растительную пищу (овощи, фрукты, ягоды и т.д), злаковые продукты (каши, хлеб, орех, крупы). Жидкости: окрашенные соки, алкоголь, газ.напитки.

НАКАНУНЕ (за день) лёгкий завтрак, обед в 13.00-14.00

Рекомендуемые часы приема препарата с 17 ч до 22 ч. Препарат принимают натощак. Раствор следует принять из расчета 15 пакетов (содержимое 1 пакета (14 г) растворяют в 200-250 мл воды непосредственно перед применением) с интервалом в 20 мин.

В день исследования: голод, не пить не есть!

Препараты от гипертонии, сердечного ритма, эпилепсии принимать ОБЯЗАТЕЛЬНО по схеме, утренние препараты принимать в 6 утра - запив, глотком воды.

При себе иметь:

- общий анализ крови
- ЭКГ с расшифровкой сроком давности не более 10 дней
- при состоянии на учете у других специалистов (кардиолог, пульмонолог, эпилептолог, невролог, гематолог) предоставить справку от врача об отсутствии противопоказаний для выполнения анестезии;
- футболку или майку, носки, тапочки.

Не пользоваться духами и помадой

Вождение авто и мото транспорта после исследования запрещено!