

Памятка по подготовке с препаратом ПИКОПРЕП (2 этапа)

ЗА 3-5 ДНЕЙ ДО ОПЕРАЦИИ ОТМЕНИТЬ КРОВОРАЗЖИЖАЮЩИЕ!
(ксарелто, кардиомагнил, аспирин, эликвис, клопидогрел и тд)

Накануне:

Легкий обед в 13.00-14.00 (Можно: прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирная рыба, нежирные кисломолочные продукты, яйца. Чай и кофе без молока, компот без ягод, сок без мякоти, безалкогольные неокрашенные напитки, ВОДА)

Запрещено: всю растительную пищу (овощи, фрукты, ягоды и т.д) злаковые продукты (каши, хлеб, орехи, крупы). Жидкости: окрашенные соки, алкоголь, газ.напитки.

1 ЭТАП

Содержимое первого пакетика, предварительно растворив его в 150 мл воды, принимают вечером (в период с 17 до 21 ч) в день, предшествующий процедуре, и запивают не менее чем 5 стаканами (по 1 стакану объемом 250 мл через каждые 15-20 мин) воды или прозрачной жидкости.

2 ЭТАП

В день исследования: голод, не пить не есть!

Препараты от гипертонии, сердечного ритма, эпилепсии принимать ОБЯЗАТЕЛЬНО по схеме, утренние препараты принимать в 6 утра - запив, глотком воды.

Содержимое второго пакетика, предварительно растворив его в 150 мл воды, принимают утром (за 9 ч до процедуры) и запивают не менее чем 3 стаканами (по 1 стакану объемом 250 мл через каждые 15-20 мин) воды или прозрачной жидкости.

с 09.30 - полный голод (ничего не есть и ничего не пить)

При себе иметь:

общий анализ крови, ЭКГ с расшифровкой сроком давности не более 10 дней (при состоянии на учете у других спец: (кардиолог, пульмонолог, эпилептолог, невролог, гематолог) предоставить справку от врача об отсутствии противопоказаний для выполнения анестезии ;

С собой футболку или майку, носки, тапочки.

Не пользоваться духами и помадой

Вождение авто и мото транспорта после исследования запрещено!