

Памятка по подготовке с препаратом ПИКОПРЕП

ЗА 3-5 ДНЕЙ ДО ОПЕРАЦИИ ОТМЕНИТЬ КРОВОРАЗЖИЖАЮЩИЕ!
(ксарелто, кардиомагнил, аспирин, эликвис, клопидогрел и тд)

ЗА 3 ДНЯ ДИЕТА (Можно: прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирная рыба, нежирные кисломолочные продукты, яйца. Чай и кофе без молока, компот без ягод, сок без мякоти, безалкогольные неокрашенные напитки, ВОДА)

Запрещено: всю растительную пищу (овощи, фрукты, ягоды и т.д), злаковые продукты (каши, хлеб, орех, крупы). Жидкости: окрашенные соки, алкоголь, газ.напитки.

НАКАНУНЕ (за день) лёгкий завтрак, обед в 13.00-14.00

1.Содержимое первого пакетика, предварительно растворив его в 150 мл воды, принимают после обеда (в период с 16 до 18 ч), и запивают не менее чем 5 стаканами (по 1 стакану объемом 250 мл через каждые 15-20 мин) воды или прозрачной жидкости

2. Содержимое второго пакетика, предварительно растворив его в 150 мл воды, принимают на ночь (в период с 22 до 24 ч) и запивают не менее чем 3 стаканами (по 1 стакану объемом 250 мл через каждые 15-20 мин) воды или прозрачной жидкости. Прозрачные жидкости можно пить вплоть до полуночи.

В день исследования: голод, не пить не есть!

Препараты от гипертонии, сердечного ритма, эпилепсии принимать ОБЯЗАТЕЛЬНО по схеме, утренние препараты принимать в 6 утра - запив, глотком воды.

При себе иметь:

- общий анализ крови
- ЭКГ с расшифровкой сроком давности не более 10 дней
- при состоянии на учете у других специалистов (кардиолог, пульмонолог, эпилептолог, невролог, гематолог) предоставить справку от врача об отсутствии противопоказаний для выполнения анестезии;
- футболку или майку, носки, тапочки.

Не пользоваться духами и помадой

Вождение авто и мото транспорта после исследования запрещено!