

# Памятка по подготовке с препаратом ЛАВАКОЛ (2 этапа)

**ЗА 3-5 ДНЕЙ ДО ОПЕРАЦИИ ОТМЕНИТЬ КРОВОРАЗЖИЖАЮЩИЕ!**  
(ксарелто, кардиомагнил, аспирин, эликвис, клопидогрел и тд)

**ЗА 3 ДНЯ ДИЕТА** (Можно: прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирная рыба, нежирные кисломолочные продукты, яйца. Чай и кофе без молока, компот без ягод, сок без мякоти, безалкогольные неокрашенные напитки, ВОДА)  
Запрещено: всю растительную пищу (овощи, фрукты, ягоды и т.д), злаковые продукты (каши, хлеб, орех, крупы). Жидкости: окрашенные соки, алкоголь, газ.напитки.

## 1 ЭТАП

**НАКАНУНЕ** (за день) лёгкий завтрак, обед в 13.00-14.00

1. Раствор следует принять из расчета 10 пакетов (содержимое пакета (14 г) растворять в 200-250 мл воды непосредственно перед применением) с интервалом в 20 мин.
2. В 19.00 - 21.00 принять два литр раствора препарата.  
После каждого принятого литра препарата не забудьте выпить 500 мл разрешенной жидкости.

## 2 ЭТАП

**В день исследования: голод, не пить не есть!**

Препараты от гипертонии, сердечного ритма, эпилепсии принимать **ОБЯЗАТЕЛЬНО** по схеме, утренние препараты принимать в 6 утра - залив, глотком воды.

- в 06.00 – 07.00 принять 5 пакетов (содержимое пакета (14 г) растворять в 200-250 мл воды непосредственно перед применением) с интервалом в 20 мин.

**С 09.30 - полный голод (ничего не есть и ничего не пить)**

**При себе иметь:**

- общий анализ крови
- ЭКГ с расшифровкой сроком давности не более 10 дней
- при состоянии на учете у других специалистов (кардиолог, пульмонолог, эпилептолог, невролог, гематолог) предоставить справку от врача об отсутствии противопоказаний для выполнения анестезии;
- футболку или майку, носки, тапочки.

**Не пользоваться духами и помадой**

**Вождение авто и мото транспорта после исследования запрещено!**